# 農作物生育状況調査報告書

2026年7月1日 現在　　池田町　　十勝農業改良普及センター十勝東部支所

| 区分 / 作物名 | 生育状況 | | | | | 特記事項 | 生育期節 | | 遅速日数 | 農作業状況 | | | | 特記事項（生育期節、障害等状況） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生育概況 | | | | | | 項目 | 月日 | | 農作業名 | 月日 | 遅速日数 | 進捗率 | |
| 秋まき小麦（きたほなみ） | 草丈 | 葉数 | 稈長 | 穂長 | 茎数 | 乳熟 | 乳熟期 | 6/23 | +3 日 | 収穫始 | ( 7/18 ) | 日 | | 生育は順調である |
| | cm | 枚 | cm | cm | 本/㎡ | | | ( 6/26 ) | | | | | | |
| | 78.9 | | | 8.7 | 803 | | 成熟期 | | | 収穫期 | ( 7/23 ) | 日 | | |
| | ( － ) | ( － ) | ( 76.3 ) | ( 8.7 ) | ( 635 ) | 100% | | ( 7/16 ) | | | | | | |
| | | | | | | | | ( ) | | 収穫終 | ( 7/26 ) | 日 | | |
| 馬鈴しょ（メークイン） | 茎長 | 茎数 | いも数 | 1個重 | でんぷん価 | 開花 | 開花期 | 6/24 | +2 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 本 | 個/株 | g | % | | | ( 6/26 ) | | | | | | |
| | 57.4 | 3.4 | | | | | 終花期 | | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 60.6 ) | ( 3.5 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | 100% | | ( 7/21 ) | | | | | | |
| | | | | | | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| 大豆（ユキホマレR） | 茎長 | 葉数 | | 着莢数 | 主茎節数 | | 開花始 | ( 7/13 ) | ± 0 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | | 個/㎡ | 節 | | | | | | | | | |
| | 23.5 | 4.3 | | | | | 開花期 | ( 7/15 ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 25.4 ) | ( 4.3 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| 小豆（エリモショウズ） | 茎長 | 葉数 | | 着莢数 | 主茎節数 | | 開花始 | ( 7/22 ) | +1 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | | 個/㎡ | 節 | | | | | | | | | |
| | 7.2 | 3.0 | | | | | 開花期 | ( 7/24 ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 8.0 ) | ( 2.8 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| 金時（秋晴れ） | 草丈 | 葉数 | | 着莢数 | 主茎節数 | | 開花始 | ( 7/10 ) | ± 0 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | | 個/㎡ | 節 | | | | | | | | | |
| | 11.5 | 2.7 | | | | | 開花期 | ( 7/12 ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 16.3 ) | ( 2.6 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| 手亡（白つむぎ） | 茎長 | 葉数 | | 着莢数 | 主茎節数 | | 開花始 | ( 7/14 ) | ± 0 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | | 個/㎡ | 節 | | | | | | | | | |
| | 7.9 | 3.6 | | | | | 開花期 | ( 7/16 ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 10.7 ) | ( 3.5 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| てん菜（直播） | 草丈 | 葉数 | 根周 | | | | | ( ) | +1 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | cm | | | | | | | | | | | |
| | 36.5 | 16.2 | 11.8 | | | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 39.8 ) | ( 16.1 ) | ( 12.3 ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| 牧草（イネ科 チモシー） | 草丈(1番) | 草丈(2番) | | | | | | ( ) | +2 日 | 収穫始 | 6/10 | +1 日 | | 収穫は平年並である |
| | cm | cm | | | | | | | | | ( 6/11 ) | | | |
| | － | 14.1 | | | | | | ( ) | | 収穫期 | 6/22 | +2 日 | 75% | |
| | ( － ) | ( 11.0 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( 6/24 ) | | | |
| | | | | | | | | ( ) | | 収穫終 | ( 7/10 ) | 日 | | |
| サイレージ用とうもろこし | 草丈 | 出葉数 | 稈長 | | | | 雄穂抽出期 | ( 7/25 ) | +1 日 | | ( ) | 日 | | 生育は平年並である |
| | cm | 枚 | cm | | | | | | | | | | | |
| | 78.0 | 10.3 | | | | | 絹糸抽出期 | ( 7/27 ) | | | ( ) | 日 | | |
| | ( 81.8 ) | ( 9.7 ) | ( － ) | ( － ) | ( － ) | | | ( ) | | | ( ) | 日 | | |
| たまねぎ（移植栽培・オホーツク222） | 草丈 | 生葉数 | 葉鞘径 | | | | | | － 日 | | | | | 生育は順調である。<br>※平年値は過去2年の平均値。 |
| | 78.8 cm | 8.6 枚 | 19.8 mm | | | | | | | | | | | |
| | ( 73.7 ) | ( 8.7 ) | ( 19.5 ) | | | | | | | | | | | |