農作物生育状況調査報告書

2026年8月1日 現在　　池田町　　十勝農業改良普及センター十勝東部支所

区分 / 作物名	生育概況					特記事項	生育期節 項目	生育期節 月日	遅速日数	農作業名	農作業状況 月日	農作業状況 遅速日数	農作業状況 進捗率	特記事項（生育期節、障害等状況）
秋まき小麦（きたほなみ）	草丈 cm － （ － ）	葉数 枚 － （ － ）	稈長 cm 81.0 （ 77.0 ）	穂長 cm 9.0 （ 8.8 ）	茎数 本/㎡ 803 （ 628 ）		成熟期	7/17 （ 7/16 ）	−1 日	収穫始 収穫期 収穫終	7/21 （ 7/18 ） 7/25 （ 7/23 ） 7/27 （ 7/26 ）	−3 日 −2 日 −1 日	 100%	収穫作業は平年並に終了した
馬鈴しょ（メークイン）	茎長 cm 85.1 （ 88.7 ）	茎数 本 3.4 （ 3.5 ）	いも数 個/株 （ ）	1個重 g （ ）	でんぷん価 % （ ）	終花 100%	終花期 茎葉黄変	7/18 （ 7/21 ） （ 8/8 ）	+3 日	収穫始 収穫期 収穫終	（ 8/26 ） （ 9/6 ） （ 9/18 ）	日 日 日		生育は順調である
大豆（ユキホマレR）	茎長 cm 73.7 （ 72.9 ）	葉数 枚 9.2 （ 9.3 ）	 （ ）	着莢数 個/㎡ （ ）	主茎節数 節 （ ）		開花始 開花期	7/13 （ 7/13 ） 7/15 （ 7/15 ）	± 0 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		生育は平年並である
小豆（エリモショウズ）	茎長 cm 55.3 （ 42.0 ）	葉数 枚 9.2 （ 9.3 ）	 （ ）	着莢数 個/㎡ （ ）	主茎節数 節 （ ）	開花 100%	開花始 開花期 成熟期	7/25 （ 7/22 ） 7/27 （ 7/24 ） （ 9/7 ）	−3 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		４、５半旬の高温多湿により栄養成長が優勢になり開花が遅れた
金時（秋晴れ）	茎長 cm 49.7 （ 50.0 ）	葉数 枚 3.5 （ 4.0 ）	 （ ）	着莢数 個/㎡ （ ）	主茎節数 節 （ ）		開花始 開花期 成熟期	7/10 （ 7/10 ） 7/12 （ 7/12 ） （ 8/29 ）	+1 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		生育は順調である
手亡（白つむぎ）	茎長 cm 48.6 （ 49.3 ）	葉数 枚 7.0 （ 7.3 ）	 （ ）	着莢数 個/㎡ （ ）	主茎節数 節 （ ）		開花始 開花期 成熟期	7/17 （ 7/14 ） 7/19 （ 7/16 ） （ 9/3 ）	−3 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		４、５半旬の高温多湿により栄養成長が優勢になり開花が遅れた
てん菜（直播）	草丈 cm 58.3 （ 57.2 ）	葉数 枚 25.0 （ 23.2 ）	根周 cm 25.0 （ 24.7 ）	 （ ）	 （ ）		 	（ ） （ ） （ ）	+2 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		生育は順調である
牧草（イネ科 チモシー）	草丈(1番) cm （ ）	草丈(2番) cm 66.4 （ 61.8 ）	 （ ）	 （ ）	 （ ）		 	（ ） （ ） （ ）	+2 日	収穫始 収穫期 収穫終	（ 8/23 ） （ 9/3 ） （ 9/26 ）	日 日 日		２番草生育は平年より2日進んでいる
サイレージ用とうもろこし	草丈 cm 290.9 （ 283.3 ）	出葉数 枚 18.3 （ 16.9 ）	稈長 cm （ ）	 （ ）	 （ ）	絹糸抽出 100%	雄穂抽出期 絹糸抽出期 乳熟期	7/25 （ 7/25 ） 7/27 （ 7/27 ） （ 8/18 ）	± 0 日		（ ） （ ） （ ）	日 日 日		生育は平年並である
たまねぎ（移植栽培・オホーツク222）	草丈 cm － （ 75.7 ）	生葉数 枚 9.9 （ 7.5 ）	葉鞘径 mm 22.5 （ 18.5 ）	球径 cm 8.2 （ 7.8 ）					−	球肥大期 倒伏始 倒伏期	7/9 7/26			生育は順調である。 ※平年値は過去2年の平均値。